

¿Cuándo deben vacunarse los niños y los adolescentes?

Edad	HepB Hepatitis B	DTaP/Tdap Difteria, tétanos, tos ferina	Hib Haemophilus influenzae tipo b	Polio	PCV Neumocócica conjugada	RV Rotavirus	MMR Sarampión, paperas, rubéola	Varicela	HepA Hepatitis A	HPV Virus del papiloma humano	MCV4 Meningocócica conjugada	Influenza (Gripe)
Al nacer	✓											
2 meses	✓ (1 a 2 meses)	✓	✓	✓	✓	✓						
4 meses	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓						
6 meses	✓ (6 a 18 meses)	✓	✓ ²	✓ (6 a 18 meses)	✓	✓ ²						✓ ³ (se pone todos los otoños o inviernos a los niños y adolescentes entre 6 meses y 18 años de edad)
12 meses		✓ ⁴ (15 a 18 meses)	✓		✓	✓						
15 meses												
18 meses												
19 a 23 meses		Ponerse al día ⁵	Ponerse al día ⁵ (hasta los 5 años)	Ponerse al día ⁵	Ponerse al día ⁵ (hasta los 5 años)		Ponerse al día ⁵	Ponerse al día ⁵				
4 a 6 años		✓		✓			✓	✓				
7 a 10 años	Ponerse al día ⁵	Ponerse al día ⁵										
11 a 12 años		✓ Tdap		Ponerse al día ⁵			Ponerse al día ⁵	Ponerse al día ⁵	Ponerse al día ⁵	✓✓✓ ⁶	✓	
13 a 18 años		Ponerse al día ⁵ (Tdap/Td)								Ponerse al día ^{5,6}	Ponerse al día ^{5,7}	

- Es posible que su bebé no necesite una dosis de la vacuna HepB a los 4 meses, dependiendo del tipo de vacuna que use su profesional de la salud.
- Es posible que su bebé no necesite una dosis de la vacuna Hib ni de la vacuna RV a los 6 meses, dependiendo del tipo de vacuna que use su profesional de la salud.
- Se recomienda una dosis para la mayoría de las personas. Los niños menores de 9 años que se van a vacunar contra la influenza por primera vez, o los que sólo recibieron 1 dosis durante la temporada anterior (si ésta fue la primera temporada en que se vacunaron), en esta temporada deben recibir 2 dosis, la segunda al menos 4 semanas después de la primera.
- Esta dosis de DTaP se puede dar incluso a los 12 meses de edad, si pasaron 6 meses desde la dosis anterior.

- Si se atrasa con alguna vacuna, o se le olvida por completo, su hijo debe recibirla lo antes posible.
- Todas las niñas y mujeres de 11 a 26 años de edad se deben vacunar con 3 dosis de la vacuna HPV, a lo largo de un período de 6 meses. Los varones y hombres de 11 a 26 años también pueden recibir una de las vacunas HPV (Gardasil) para reducir la probabilidad de contraer verrugas genitales. La vacuna se puede dar incluso a niños de 9 años de edad.
- Si tiene un adolescente que va a ir a la universidad y tiene planes de vivir en una residencia estudiantil, y no lo vacunaron antes contra la enfermedad meningocócica, se debe vacunar ahora.

Nota: Algunos niños pueden necesitar más vacunas. Hable con su profesional de la salud.